



CATÁLOGO BOVINOS



Alimento balanceado



Línea LECHE

LECHERA ENERGÉTICA	LECHERA 12	LECHERA 13	LECHERA 16	LECHERA 19
Pastoreo muy bueno de alfalfa, avena, trébol, raygrass.	Pastoreo bueno de alfalfa, avena, trébol, raygrass pero en cantidades limitadas en consumo y complementando con silos de cereal y/o granos.	Pastoreo bueno con baja disponibilidad de alfalfa, avena, trébol, raygrass y mayor complemento con silos de cereales, rollos y/o granos.	Pastoreo regular con baja disponibilidad de alfalfa, avena, trébol, raygrass y mayor complemento con silos de cereales, rollos y/o granos.	Pastoreo muy pobre con baja disponibilidad de alfalfa - avena - trébol - raygrass y mayor complemento con silos de cereales, rollos y/o granos.
P. B. mín: 10 % E. M. mín.: 2900 Kcal/kg	P. B. mín: 12 % E. M. mín.: 2750 Kcal/kg	P. B. mín: 13 % E. M. mín.: 2800 Kcal/kg	P. B. mín: 16 % E. M. mín.: 2750 Kcal/kg	P. B. mín: 19 % E. M. mín.: 2850 Kcal/kg

CONCENTRADO 30	PREPARTO
Está formulada para establecimientos tamberos que disponen de grano de cereales, silos de cereales, henos, pasturas. Según disponibilidad, se formula la ración adecuada a la producción de leche estimada corrigiendo con CONCENTRADO 30 la dieta para lograr los objetivos. Nuestro Departamento Técnico asesora sin costo para el armado de la ración.	Durante el período de secado, aproximadamente 60 días preparto, deben recibir una dieta especial, aniónica. Para ello se recomienda nuestro alimento PREPARTO. La ración debe estar compuesta por silos de cereal, rollos de moha, cereales y alimento PREPARTO (2,5 a 3 kg/día/vaca). Puede consultarse a nuestro Departamento Técnico la conformación de la ración y la cantidad a suministrar por día.
P. B. mín.: 27% E. M. mín.: 2500 Kcal/kg	P. B. mín.: 10,5 % E. M. mín.: 2700 Kcal/kg

Para ampliar sobre alguna indicación nuestro Departamento Técnico lo asesorará sin costo.

Línea CARNE

TERNERO INICIADOR 21	TERNERO 18	TERNERO INICIADOR 18 CON FIBRA
TERNERO desde 50 kg a 80 kg de peso vivo	TERNERO desde 80 a 110/120 kg de peso vivo	TERNERO desde 80 a 110/120 kg de peso vivo
Puede emplearse en destete precoz con sustitutos de leche o pre-iniciadores y con fardos de alfalfa tiernos. Contiene todos los macronutrientes, vitaminas liposolubles e hidrosolubles y micro-macrominerales necesarios para un óptimo desarrollo.	Se recomienda con pastoreo o henos de alfalfa tiernos. Alimentar con TERNERO 18 después del pastoreo o suministro de henos para obtener mejor performance. Contiene todos los macronutrientes, vitaminas liposolubles e hidrosolubles y micro-macrominerales necesarios para un óptimo desarrollo.	Se suministra a terneros como única ración, sin necesidad de otro complemento en caso de no disponer de pasturas o henos. Alimento diseñado para estrategias de alimentación encerrados en corral.
P. B. mín.: 21 % E. M. mín.: 2900 Kcal/kg	P. B. mín.: 18 % E. M. mín.: 2880 Kcal/kg	P. B. mín.: 18 % E. M. mín.: 2850 Kcal/kg

TERNERO 16

TERNERO

desde 120 a 260 kg de peso

Complementar con pastoreo o henos de buena calidad.

Alimentar con TERNERO 16 después del pastoreo o suministro de henos para obtener mejor performance. Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micro y macro - minerales para un óptimo desarrollo.

P. B. mín.: 16 %
E. M. mín.: 2850 Kcal/kg

INICIADOR FEED LOT

TERNERO

en corral desde 120 a 260 kg

Alimento para ser suministrado como única ración completa dos veces por día diseñado para estrategias de alimentación encerrados en corral.

Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micro y macro - minerales necesarios para un óptimo desarrollo.

P. B. mín.: 15 %
E. M. mín.: 2850 Kcal/kg

CONCENTRADO 30

Complemento proteico- vitamínico - micro/macro minerales y otros aditivos nutricionales para el ganado vacuno, que complementado con recursos del establecimiento como cereales. Subproductos, henos, silos, pasturas; permiten formular raciones adecuadas a lo requerido en cada caso.

Consulte Dpto. Técnico.

P. B. mín.: 27 %
E. M. mín.: 2500 Kcal/kg

ENGORDE NOVILLO

NOVILLOS

De 300 kg peso vivo hasta terminación.

Complementar con pastoreo o henos en proporción del 0,4 % del peso vivo (materia seca).
Recomendación: Suministrar el alimento balanceado después del pastoreo o del heno.
Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micros y macrominerales necesarios para una óptima terminación del animal.

P. B. mín.: 11 %
E. M. mín.: 2800 Kcal/kg

ENGORDE CON FIBRA

NOVILLOS

En campo o encerrados en corral a partir de 350 kg hasta su terminación.

Contiene fibra para evitar trastornos digestivos por falta de recursos forrajeros como pastos, henos y/o silajes.
Es una ración completa, no requiere otro complemento y debe alimentarse de mañana y tarde.

P. B. mín.: 11 %
E. M. mín.: 2800 Kcal/kg

VACUNO TERMINADOR

TERMINAR

Vacunos - Terneros - Novillos

Complementarse con pastoreo a campo, o en corral con past cortado. heno o silos en proporción mínima del 0,4 % del peso vivo (materia seca).
Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micro y macrominerales.

P. B. mín.: 10 %
E. M. mín.: 2900 Kcal/kg

TERMINADOR FEED LOT

TERMINAR

Novillitos de 240 a 350 kg

EN CORRAL: suministrar como única ración por ser un alimento balanceado completo, que no requiere ningún otro complemento.

Alimentar 2 veces por día.

Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micro y macrominerales.

P. B. mín.: 11 %
E. M. mín.: 2880 Kcal/kg

INVERNADA

Este alimento contiene todos los macro-micronutrientes para complementar a pastores.
Puede suministrarse desde 1 Kg por día hasta el 2,5% del peso vivo si no hubiese pasto (fibra), sin causar trastornos de acidosis.

P. B. mín.: 13,5 %
E. M. mín.: 2650 Kcal/kg

TOROS

A partir de los 350 kg de peso vivo

Deben consumir el 2% del peso vivo en dos veces al día. Si están a campo deben pastorear primero y luego consumir el alimento TOROS, tanto de mañana como de tarde. Si están a CORRAL, debe complementarse el alimento TOROS con henos. Primero deben consumir heno y luego el alimento TOROS (mañana y tarde). NO DEBE SUMINISTRARSE EL ALIMENTO TOROS DE UNA SOLA VEZ. Si el comedero está a libre disposición del animal, debe poder restringirse su acceso para que solo ingieran la cantidad indicada, de la manera indicada también en dos veces al día. Esto es fundamental para evitar acidosis y sus posteriores dificultades. Contiene macronutrientes, vitaminas liposolubles y todos los micros y macrominerales.

P. B. mín.: 12%
E. M. mín.: 2800 Kcal/kg